

ZGODA NA LECZENIE AMPUTACYJNE/KANAŁOWE ZĘBA MLECZNEGO

w gabinecie dentystycznym Kids Dental, mieszczącym się w Warszawie, przy ulicy Księcia Janusza 42 lok. U3, prowadzonym przez dr n.med. Katarzynę Kajka-Hawryluk, nr prawa wykonywania zawodu: 2355161.

DANE PACJENTA (imię, nazwisko, data urodzenia)

.....

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (imię, nazwisko, nr pesel)

.....

Uwagi ogólne:

Głęboka próchnica, uraz zęba, czynniki jatrogenne mogą doprowadzić do zmian zapalnych miazgi zęba i związanych z tym następstw – ból zęba, ból kości, obrzęk dziąsła lub policzka, zmiany zapalne w kości, uszkodzenia zawiązka zęba stałego, wzrost temperatury ciała;

W przypadku zębów mlecznych postępowanie lecznicze w takim przypadku obejmuje usunięcie zęba lub leczenie amputacyjne / kanałowe;

Usunięcie zęba: daje najbardziej przewidywalne skutki lecznicze – pozwala na pozbycie się przyczyny stanu zapalnego, ale wiąże się niepożądanymi okolicznościami lub następstwami:

1. Usunięcie zęba mlecznego, zwłaszcza trzonowego (czwórka i piątka), w czasie gdy korzenie zęba są jeszcze zachowane nie jest prostym zabiegiem: należy uzyskać skuteczne znieczulenie – samo podanie znieczulenia u dziecka wiąże się m.in. z ryzykiem skaleczenia, powstania krwiaka, lub niezyskaniem wystarczającego efektu znieczulającego; oraz wiąże się jak wiele procedur medycznych z ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej; obecność niezresorbowanych korzeni czyni zabieg usunięcia zęba mlecznego dość trudnym technicznie – lekarz może skierować do chirurga stomatologicznego;
2. Przedwczesna utrata zęba mlecznego, zwłaszcza ostatniego trzonowca powoduje utratę miejsca dla stałego następcy (jednoimiennego zęba stałego) i problemy ortodontyczne w przyszłości;
3. Utrata siekaczy może przyczynić się do powstania dysfunkcji języka, nieprawidłowego wyrżnięcia się stałych siekaczy, powstania dysproporcji w rozmiarach szczęki górnej i dolnej

Miejsca po przedwczesnie utraconych zębach mlecznych można zabezpieczyć aparatami ortodontycznymi wykonanymi w niedługim czasie po usunięciu zębów – ok. 2 – 4 tygodnie.

Leczenie amputacyjne / kanałowe - pozwala uniknąć lub odroczyć usunięcie zęba. Można wykonać u dzieci nieobciążonych chorobami ogólnymi. Leczenie to wymaga dużo czasu – jedna lub dwie/trzy wizyty po ok. 30min, wymaga nakładów finansowych (leczenie kanałowe i odbudowa zęba) i niekiedy kończy się niepowodzeniem, czyli wystąpieniem powikłań i koniecznością usunięcia zęba. W przypadku sukcesu klinicznego ząb taki należy kontrolować radiologicznie, czyli prześwietlać (po 3, po 6 i po 12 m-cach).

Zapoznałem się z powyższą informacją i zrozumiałem ją. *Wybrać z poniższych:*

- Wyrażam zgodę na leczenie amputacyjne/kanałowe zęba..... mojego dziecka.
- Nie wyrażam zgody na leczenie amputacyjne/kanałowe zęba mojego dziecka.

Data, podpis.....